



อะเบท 1% เอสซี สารป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง

อะเบท เป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงรำคาญ ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะเก็บน้ำ และท่อระบายน้ำภายในบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี

อะเบท ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ เช่น ยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ ทำให้ลูกน้ำยุงตายภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 3 เดือน

อะเบท ยังสามารถใช้กำจัดตัวอ่อน ของแมลงต่างๆ ได้ดีอีกด้วย เช่น วัชนาจัด วัชนาเค็ม วัชนา เต็มเมล็ด วัชนา ราวสาอะเบท ปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด

ยกเว้น ปลาทองซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้

กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก
รับรองให้

ใช้ อะเบท 1% เอสซี ในน้ำดื่มหน้าใช้ได้

วิธีการใช้ อะเบท 1% เอสซี กำจัดลูกน้ำยุง

1. ใส่ในหนองน้ำทั่วไป ใช้อัตรา 200 กรัมต่อพื้นที่ผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
2. ใส่ในท่อระบายน้ำ ท่อรอง ใช้อัตรา 200-300 กรัมต่อพื้นที่ผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
3. ใส่ในภาชนะบรรจุน้ำดื่ม น้ำใช้ ใช้อัตรา 1 กรัมต่อหน้า 2 แกลลอน หรือ 2 ช้อนชาต่อหน้า 140 ลิตร
 - ตุ่มมังกร (น้ำ 8-10 ปีบ) ใช้อัตรา 2 ช้อนชา
 - ตุ่มซีเมนต์ (น้ำ 12 ปีบ) ใช้อัตรา 2 ช้อนชาครึ่ง
4. ใส่ในที่รองขาตู้กับข้าว แจกัน ใช้อัตรา 3-5 กรัม หรือ 1/10 ช้อนชา
5. เพื่อให้การกำจัดลูกน้ำยุงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรกำจัดตัวเต็มวัยของลูกน้ำยุงควบคู่กันไป

ในหนึ่งปี ควรใช้ อะเบท 2 ครั้ง
ครั้งแรกใช้ก่อนถึงฤดูฝน

ครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 3 เดือน

คำเตือน

- ควรใช้ อะเบท ตามอัตราที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง
- ก่อนใช้ อะเบท ควรศึกษารายละเอียดและอ่านคำแนะนำวิธีการใช้ในฉลาก และปฏิบัติตามใบเสร็จครีดิ

จำหน่ายโดย : บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด
518/5 อาคารพาณิชย์เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2548301-7

โทร. 845/2546

ร้าน สุกโชก เฌอคอล ซีพีพลาซ่า
168/1 หมู่ 25 ถนนกสิกรรมบำรุงสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 086-311-2730, 081-183-7766
<http://www.thaitemphos.com>



ปลอดภัยจากยุงร้าย

กำจัดยุงร้ายต้องทำลายที่ต้นเหตุ
ใช้ อะเบท กำจัดลูกน้ำยุง



ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

BASF
The Chemical Company

ไข่เลือดออก

มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง โดยมี **ยุงลาย** เป็นพาหะนำโรค มักเกิดขึ้นกับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะเด็กก่อนเข้าโรงเรียน

อาการของไข่เลือดออก

- ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้
- มีไข้สูงติดต่อกัน 2-3 วัน
- ปวดศีรษะ
- ปวดท้อง เจ็บลิ้นปี่ และเบื่ออาหาร
- บางรายมีเลือดกำเดาออกทางจมูก
- เจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา
- มีจุดเลือดออกเป็นผื่นแดงเล็ก ๆ ใต้ผิวหนัง
- อาเจียนเป็นเลือด
- ถ่ายเป็นเลือด

หากไม่รีบนำส่งแพทย์หรือรักษาไม่ถูกวิธี ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้



▼ อาการแสดงจุดเลือดออกบริเวณแขน

ยุงลาย พาหะนำโรคไข่เลือดออกมีลักษณะเป็นยุงตัวเล็กสีดำ มีลายขาวสลับกับบริเวณลำตัว ส่วนขาและท้องแบ่งเป็นปล้อง ๆ ชอบหากินเวลากลางวัน ชอบอยู่ในที่มืด มักวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำสะอาดซึ่งอยู่ ไข่ของยุงลายสามารถทนต่ออากาศแห้งได้ดี ไข่จะลจจเป็นลูกน้ำ และลอกคราบเป็นตัวยุงประมาณ 8-12 วัน



ยุงลาย

ลูกน้ำยุง

ไข่เลือดออก โรคร้ายจากยุงลาย

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย



ยุงลาย เป็นพาหะทำให้เชื้อไวรัสสาเหตุโรคไข่เลือดออกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

วิธีป้องกันไข่เลือดออก คือ การป้องกันมิให้ยุงลายกัดคนและวางไข่ โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ต่าง ๆ ให้หมดไป

แหล่งที่พบลูกน้ำยุงลายมาก ได้แก่ ตุ่มน้ำในและนอกบ้าน น้ำในร่องขาตู้กับข้าว แจกัน จานรองกระถางต้นไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำนิ่ง เช่น กระป๋อง ไซ้ อย่าง ไท ยางรถยนต์เก่า แจกันศาลพระภูมิ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ควรระวังบุตรหลานทำน้ำให้ปลอศภัยจากไข่เลือดออกโดย

1. อย่านำน้ำดื่มที่เก็บไว้ในตอนกลางวัน ความร้อนนอนในที่สว่าง และกางมุ้งนอน
2. อย่านำน้ำทิ้งในบริเวณบ้าน ควรทำสายพานทิ้งน้ำทิ้งแล้ว เช่น ไท ข้ามแตก กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น
3. ปิดฝาตุ่มน้ำทุกครั้งที่เสร็จสิ้น
4. นำในภาชนะที่ใส่ควรรเปลี่ยนทุก 7 วัน

การปราบยุงลายและลูกน้ำยุงลายเป็นการป้องกันไข่เลือดออกที่ต้นเหตุ ควรใช้ อะเบท ความคุมลูกน้ำยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดยุงลาย กำจัดไข่เลือดออก